

ORGANİK KAYNAKLI DİĞER ÜRÜNLER
SIVI HALDEKİ HUMİK ASİT



CHI – LIQUID HUMUS 24

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W / W
Toplam Organik Madde	% 6,6
Toplam (Humik + Fulvik) Asit	% 12
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 2,5

pH Aralığı: 7 – 9

ÜRETİCİ FIRMA

CANADIAN HUMALITE INTERNATIONAL INC.
5719 – 97 Street
Edmonton, AB T6E 3H9
Tel # 780-488-4810
KANADA

İTHALATÇI FIRMA

SEREKS DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Fahrettin Kerim Gökay Cad. Okul Sok.
Altunizade Sit. E Blok No: 9/1 Üsküdar / İSTANBUL
Tel: + 90 216 428 62 14 Fax: + 90 216 428 62 15
e-mail: info@sereks.com
www.sereks.com

Toprak ve / ve ye yaprak analizi yaptırılarak ürünün kullanılması tavsiye edilir.

UYGULAMA YERİ, ŞEKLİ, ZAMANI VE DOZU

TARLA BİTKİLERİ (Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Yem Bitkileri, Şeker Pancarı vb.)

Uygulama Şekli ve Dönemi:

Topraktan (Ekim Öncesi) : Toprağın Ekime Hazırlanmasından sonra 400 ml./dekar doz olarak uygulanır.

Yapraktan (Ekim Sonrası) : Bitkiler 20-25cm boya ulaştıkları an itibariyle 50 ml./100 lt. su olarak uygulanır, gereklilik halinde 2-3 hafta sonra tekrar edilir.

SEBZELER (Patates, Salatalık, Domates, Kavun, Karpuz, Marul, Çilek, Fasulye, Bezelye vb.)

Uygulama Şekli ve Dönemi:

Topraktan (Ekim Öncesi) : Toprağın Ekime Hazırlanmasından sonra 400 ml./dekar doz olarak uygulanır.

Topraktan: Fidelerin, şaşırtılması esnasında 100 lt can suyuna 200 ml. dozda katılarak fidelere verilir. Damla veya sulama suyuna da dekara 250 ml. hesabı ile kullanılır. Sezon boyunca 4-6 kez tekrarlanır. Seralarda damla sulamada dekara 500 ml. dozda 1 ay ara ile 2-3 defa uygulanır.

Yapraktan: Bitkiler 20-25cm boya ulaştıkları an itibariyle 50 ml./100 lt. su olarak uygulanır, gereklilik halinde 2-4 hafta ara ile tekrar edilir.

MEYVE AĞAÇLARI (Şeftali, Kiraz, Erik, Badem, Bağ, Narenciye, Zeytin, Muz vb.)

Uygulama Şekli ve Dönemi:

Topraktan: Ağaçlarda vejetatif gelişme başlayınca 25 ml. (ağaç başına) ağacın taç iz düşümüne gelecek şekilde, damlama sulama veya sulama suyuna katılarak dekara 250 cc dozda uygulanır. Bu uygulama şekilleri, meyve oluşum dönemi ve irileşme başlangıcı itibariyle tekrarlanır.

Yapraktan: Ağaçların yaşına ve çeşidine dikkat edilerek yapraklı oldukları dönemlerde yapılan ilaçlamalar ile birlikte 50-100 ml./100 lt. su dozunda 2-3 uygulama yapılır.

YEŞİL AÇIK ALANLAR

İlkbahar ile birlikte 3-4 hafta aralıklarla 200 ml./ 100 lt. su dozunda uygulanır.

KARIŞTIRMA TALİMATI:

CHI Liquid Humus 24, daha önceden sulandırılmış Tarım ilaçları ve yaprak besinleriyle karıştırabilirsiniz. Fakat mutlaka ön karışım testi yaparak karışa bilirliliği kontrol ediniz.

SEREKS DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Fahrettin Kerim Gökay Cad. Okul Sok.
Altunizade Sit. E Blok No: 9/1 Üsküdar / İSTANBUL
Üsküdar V.D/ 762 017 7070

Metin OCAKTAN
Şirket Vekili