

EC FERTİLİZER
BAKIRLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ
(Bakır Sülfat İçerikli)

Copper 5 %

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Suda Çözünür Bakır (Cu)

W / W
% 5

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANINIZ!



ÜRETİCİ FİRMA

AGXPLORE INTERNATIONAL, INC.
P.o.Box 638 7035 State Hwy. Drjve
PARMA MO. 63870 / ABD

İTHALATÇI FİRMA

SEREKS DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
Deri ve End. Serbest Bölgesi
Nüzhet Kodalak Sok. No:2 K:2
Tuzla / İSTANBUL

UYARILAR: Kullanmadan önce mutlaka okuyunuz. Kullanmadan önce çalkalayınız. Ürünün hazırlanması için açık alanları havadar yerleri tercih ediniz. Yüksek ısıveren cihazların (Isıtıcı) ve Alev (Ateş) olan yerlerin etrafında, yanında kullanmayınız. Kullanım sırasında ağız yoluyla alınması halinde zararlıdır. Kusma gibi belirtiler olabilir derhal doktora başvurulmalıdır. Göze temas halinde tahriş'e sebebiyet verir, bu durumda 15 dakika temiz su ile çalkalayıp tıbbi yardım alınız. Vücudunuza (teninize) temas etmesinden kaçınınız, kullanım sonrası mutlaka ellerinizi yıkayınız. Ürünün garantisini kimyasal ve kullanım talimatlarına uygun ve normal koşullarda uygulandığında geçerli olur.

ÇOCUKLARDAN VE EVCİL HAYVANLARDAN UZAK TUTUNUZ.

DEPOLAMA VE ATIK: Ambalajı oda ısısında ve kapalı olarak saklayınız. Güneş ve dondan koruyunuz. Serin ve kuru yerde saklayınız. Orijinal ambalajının dışında farklı bir saklama kabı kullanmayınız. Kabın ağzını kullandıktan sonra sıkıca kapatınız. Biten boş ambalaj kutularını farklı amaçlar için kullanmayınız, 3 kez içlerini çalkalayıp imha edilebilmesi için katı atık veya geri dönüşüm noktalarına ulaşmasını sağlayınız. **Depolama Sıcaklığı 0 ile + 45 °C arasında olmalıdır.**

KARIŞTIRMA TALİMATI:

Copper 5%, su ile beraber karıştırılarak bitkiye verilmelidir. Kesinlikle pestisit vs. başka bir ürünle karıştırılmamalıdır. **Fakat mutlaka ön karışım testi yaparak karışabilirliği kontrol ediniz.**

Bakanlık Tescil No:
Bakanlık Lisans No:
Net Ağırlık:
Hacim:

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:



06.06.2013

KULLANMA TALİMATI:

Copper 5%, Klorofil sentezinde ve fotosentez elektron transferinde etkili olup bitkide hareketsizdir. Tüm sebzelerde, Meyvelerde, Turunçgillerde, Zeytinde, Bağda, Tarla bitkilerinde bitkinin ihtiyaç duyduğu dönemler dikkate alınmak suretiyle (2-3 uygulama) yapraktan veya topraktan ortalama doz 200 ml – 400 ml / 100 Litre su olarak uygulanır. Bakır eksikliğinde, ilk belirtiler genç yaprakların solgun görünmesi ve tepe noktasında ölümlerin başlamasını sağlar. Toprakta organik madde miktarı yüksek olan yerlerde **Copper 5 %** sayesinde bakırın bitki içine girişi ve bitki bünyesine taşınması hızla olmakta ve bakırın eksikliğinden doğan sorunlar giderilmektedir. Her tip toprakta ve iklim koşullarında uygulanabilen, bitkinin kökleri ve yaprakları kolayca ve tamamen alınan özel yapıya sahip sıvı "sistemik" bakır gübresidir. Yapraktan uygulama sonrası hava sıcaklığına bağlı olarak 2 saat içerisinde bitki içerisine alım hızı %100'dür. Tüm gübre uygulamalarını önceden alacağınız toprak testi veya bitki doku analizleri sonuçlarına göre yapınız. **(Daha geniş bilgi için lütfen bayiinizi arayınız.)**

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, Aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

SEREKS DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.
İstanbul, Deri Serbest Bölgesi (Free Zone)
Nüzhet Kodalak Sok. No: 2 Kat: 2 - Tuzla - İST.
Tel: 0216 428 62 15 / Fax: 0216 428 62 15

Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili